

# レジメン名称: G-SOX

胃癌

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

|          |                           |                           |   |
|----------|---------------------------|---------------------------|---|
| 薬剤       | 投与量                       | 投与日                       | 1 コース 3 週間                              |
|          |                           | Day 1.....8.....15.....22 |   |
| オキサリプラチン | 100 mg/m <sup>2</sup>     | ↓                         |   |
| S-1(内服)  | 80 mg/m <sup>2</sup> /day | ↓.....↓                   | オキサリプラチン投与日の夕から 15 日目の朝まで 2 週間内服、1 週間休み |

レジメンオーダー以外に必要な処方

Day1~:S-1 2×朝夕食後、day1 タ〜 14 日分

必要時 (制吐剤予防投与) : day2~ : デキサメタゾン (デカドロン) 4~8mg 1×朝 2 日間 内服

### 注意

SOX (胃癌) はオキサリプラチン 100 mg/m<sup>2</sup> (G-SOX)、130mg/m<sup>2</sup> の 2 種類がレジメン登録されています。

| S-1 投与量                   | 体表面積 (m <sup>2</sup> )                       | 投与量         |
|---------------------------|--|-------------|
| 80 mg/m <sup>2</sup> /day | 1.25 m <sup>2</sup> 未満                       | 20 mg 4T 2× |
|                           | 1.25 m <sup>2</sup> 以上~1.5 m <sup>2</sup> 未満 | 25 mg 4T 2× |
|                           | 1.5 m <sup>2</sup> 以上                        | 20 mg 6T 2× |

### 注意事項

S-1 はオキサリプラチン投与日の夕から開始です。

| 投与方法 : 1 日目 |  |
|-------------|--|
| 1           | 生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用<br>メインルートにつなぎ、プライミング<br>点滴筒 (チェンバー) を 3/4 程度満たす           |
| 2           | グラニセトロン 3mg/100mL 1V、デキサート(3.3mg/1.0mL) 2A<br>30 分かけて点滴、メインルートから投与<br>終了後、メインルートを止める |
| 3           | オキサリプラチン _____ mg, 5%ブドウ糖 500mL<br>2 時間かけて点滴、ケモセーフロックのルートより投与                        |
| 4           | 生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄   |