

レジメン名称: S-1(3 投 2 休) + シスプラチン(day 8) , q5w

胃癌

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 5 週間 Day 1.....8.....15.....22.....29.....36
S-1(内服)	80 mg/m ² /day	↓..... ↓ 1 日目から 21 日目までの 3 週間内服、2 週間休み
シスプラチン	60mg/m ²	↓

レジメンオーダー以外に必要な処方

Day1～:S-1 2×朝夕食後、day1～ 21 日分

必要時 (制吐剤予防投与) : day 9～ : デキサメタゾン (デカドロン) 4～8mg 1×朝 2 日間 内服

S-1 投与量	体表面積 (m ²)	投与量
80 mg/m ² /day	1.25 m ² 未満	20 mg 4T 2×
	1.25 m ² 以上～1.5 m ² 未満	25 mg 4T 2×
	1.5 m ² 以上	20 mg 6T 2×

注意事項

イメンド使用時は day8 のデキサート(3.3mg/1.0mL) 3A へ減量してください。

シスプラチン : 尿測指示が必要ないか、確認してください。

イメンド : 内服指示がある場合は服用時間に注意してください。

投与方法 : 7～9 日目 (前負荷 7 日目、抗がん剤点滴投与日を 8 日目として記載)			
7 日目	1	15:00	ケモセーフロックの点滴セットを使用 ソルデム 1 500mL 5 時間かけて点滴、メインルートから投与 最初に点滴筒 (チェンバー) を 3/4 程度満たす
	2	20:00	ソルデム 3A 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与
8 日目	3	00:00	ソルデム 1 500mL 6 時間かけて点滴、メインルートから投与
	4	6:00	ソルデム 3A 500mL 5 時間 30 分かけて点滴、メインルートから投与
	5	11:30	グラニセトロン 3mg/100mL 1V、デキサート(3.3mg/1.0mL) 5A 30 分かけて点滴、メインルートから投与
	6	12:00	※メインルートを止めてから シスプラチン _____ mg, 生食、全量 500mL 120 分かけて点滴 ケモセーフロックのルートより投与
	7	14:00	ソルデム 1 500mL 3 時間かけて点滴、メインルートから投与
	8	17:00	ソルデム 3A 500mL 3 時間かけて点滴、メインルートから投与
	9	20:00	ソルデム 1 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与
9 日目	10	00:00	ソルデム 1 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与
	11	4:00	ソルデム 3A 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与
	12	8:00	ソルデム 1 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与