

レジメン名称: SOX (130) + トラスツズマブ

胃癌

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22
トラスツズマブ	1 回目 8 mg/kg、 2 回目 ~6mg /kg	↓
オキサリプラチン	130 mg/m ²	↓
S-1(内服)	80 mg/m ² /day	↓.....↓ オキサリプラチン投与日の夕から 15 日目の朝まで 2 週間内服、1 週間休み

レジメンオーダー以外に必要な処方等

心機能チェック、Day1~:S-1 2×朝夕食後、day1 夕 ~ 14 日分

必要時 (制吐剤予防投与) : day2~ : デキサメタゾン (デカドロン) 4~8mg 1×朝 2 日間 内服

S-1 投与量	体表面積 (m ²)	投与量
80 mg/m ² /day	1.25 m ² 未満	20 mg 4T 2×
	1.25 m ² 以上 ~1.5 m ² 未満	25 mg 4T 2×
	1.5 m ² 以上	20 mg 6T 2×

注意事項

S-1 はオキサリプラチン投与日の夕から開始です。

心機能に注意 トラスツズマブ投与前には心機能を評価する (EF 50%以上)

投与方法 : 1 日目	
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒 (チェンバー) を 3/4 程度満たす
2	<u>トラスツズマブ</u> _____ mg, 生食 250mL トラスツズマブは注射用水で溶解 : 60mg/3mL、150mg/7.2mL 90 分, (問題なければ) 次は 60 分, (問題なければ) 以降 30 分、メインルートから投与 注意 : 点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与 (初回扱い)
3	グラニセトロン 3mg/100mL 1V、デキサート(3.3mg/1.0mL) 2A 30 分かけて点滴、メインルートから投与 終了後、メインルートを止める
4	<u>オキサリプラチン</u> _____ mg, 5%ブドウ糖 500mL 2 時間かけて点滴 ケモセーフロックのルートより投与
5	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄