

# レジメン名称(アブラキサン単独 (3投1休, q4w))

胃癌

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_ )

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日	1 コース 4 週間
		Day 1	.....8.....15.....22.....29
アブラキサン	100 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓

## 注意事項

アルブミン含有のため、血液製剤同意書を取得して下さい。

フィルター付きラインは使用しないこと

アブラキサンは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

アブラキサン懸濁液はすみやかに使用し、すぐに使用しない場合は冷蔵庫(2~8℃)で遮光保存し、8時間以内に使用すること。

投与方法：1日目	
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セット(フィルターなし)を使用 メインルートプライミングし、点滴筒(チェンバー)を3/4程度満たし、止める
2	デキサート(3.3mg/1.0mL) 2A、生食 50mL 15分かけて点滴、メインルートから投与
3	生食 100mL ゆっくり、ウォッシュアウト メインルートから(15分ほど) 終了時、点滴筒(チェンバー)を3/4程度満たされていること。 終了後、メインルートを止める <b>最後のウォッシュアウトで使用するので、使い切らないこと</b>
4	<b>アブラキサン</b> _____ mg、生食(100 mLのボトル) 30分かけて、ケモセーフロックのルートから投与 (液量は投与量により変わるため、ラベルを確認)
5	3の生食を使用し、ウォッシュアウト 15分かけて、適宜途中終了可、残は破棄