

レジメン名称(カペシタビン+トラスツズマブ q3w)

胃癌

ID 患者氏名 様 (性別)

身長 cm 体重 kg 年齢 歳 体表面積 m²

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22
トラスツズマブ	1 回目 8 mg/kg、2 回目 ~6mg /kg	↓
カペシタビン(内服)	2000 mg/m ² /日	↓.....↓ Day1 の夕から 15 日目の朝まで 2 週間内服、1 週間休み

レジメンオーダー以外に必要な処方等

心機能チェック、 Day1~:カペシタビン 2×朝夕食後、day1 タ〜 14 日分

カペシタビンの HFS 予防 : Day1〜ピドキサール (20) 3T 3× (毎日)、

ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% (ヒルドイドソフト) 2 本 1 日数回

カペシタビン投与量	体表面積 (m ²)	投与量 (1 錠 300mg)
	1.36 未満	8 T 2× (2400 mg/日)
	1.36 以上 1.66 未満	10 T 2× (3000 mg/日)
	1.66 以上 1.96 未満	12 T 2× (3600 mg/日)
	1.96 以上	14 T 2× (4200 mg/日)

注意事項

カペシタビン : 服用開始のタイミングに注意してください (トラスツズマブ投与日の夕から開始)。

心機能に注意 トラスツズマブ投与前には心機能を評価する (EF 50%以上)

投与方法 : 1 日目	
1	(ケモセーフ不要) 生食 100mL メインルートをプライミング
2	トラスツズマブ mg, 生食 250mL トラスツズマブは注射用水で溶解 : 60mg/3mL、150mg/7.2mL 90 分、(問題なければ) 次は 60 分、(問題なければ) 以降 30 分、メインルートから投与 注意 : 点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与 (初回扱い)
3	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄