

ID
患者氏名
様
（性別
）

身長
cm
体重
kg
年齢
歳
体表面積
m²

薬剤	投与量	投与日		1 コース 4 週間
		Day 1.....8.....15.....2229		
ベバシズマブ	5 mg/kg	↓		↓
イリノテカン	125 mg/m ²	↓		↓
S-1(内服)	80 mg/m ² /day	↓.....↓		
イリノテカン投与日の夕から 15 日目の朝まで 2 週間内服、2 週間休み				

レジメンオーダー以外に必要な処方

Day1～:S-1 2×朝夕食後、day1 夕～ 14 日分

必要時（制吐剤予防投与）：点滴翌日～：デキサメタゾン（デカドロン）4～8mg 1×朝 2 日間 内服

注意

IRIS は CPT-11 100 mg/m²、125 mg/m² の 2 種類がレジメン登録されています。

ベバシズマブ：尿タンパク測定

S-1 投与量	体表面積（m ² ）	投与量
80 mg/m ² /day	1.25 m ² 未満	20 mg 4T 2×
	1.25 m ² 以上～1.5 m ² 未満	25 mg 4T 2×
	1.5 m ² 以上	20 mg 6T 2×

注意事項

S-1 はイリノテカン投与日の夕から開始

投与方法：1、15 日目	
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たす
2	グラニセトロン 3mg/100mL 1V、デキサート(3.3mg/1.0mL) 2A、デキサート(1.65mg/0.5mL) 1A 30 分かけて点滴 メインルートから投与
3	ベバシズマブ mg, 生食 100mL 90 分、（問題なければ）次は 60 分、（問題なければ）以降 30 分、メインルートから投与 注意：点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与（初回扱い） 終わったらメインルートを止める
4	イリノテカン mg, 生食 500mL 90 分かけて点滴 ケモセーフロックのルートから投与
5	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄