

# レジメン名称: S-1(d1-14)+Bev(d1)\_q3w

大腸癌

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_ )

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

| 薬剤      | 投与量                       | 投与日                                              |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|         |                           | 1 コース 3 週間<br>Day 1.....8.....15.....22          |
| ベバシズマブ  | 7.5 mg/kg                 | ↓                                                |
| S-1(内服) | 80 mg/m <sup>2</sup> /day | ↓.....↓<br>ベバシズマブ投与日の夕から 15 日目の朝まで 2 週間内服、1 週間休み |

レジメンオーダー以外に必要な処方

Day1～:S-1 2×朝夕食後、day1 夕～ 14 日分

ベバシズマブ：尿タンパク測定

| S-1 投与量                   | 体表面積 (m <sup>2</sup> )                       | 投与量         |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 80 mg/m <sup>2</sup> /day | 1.25 m <sup>2</sup> 未満                       | 20 mg 4T 2× |
|                           | 1.25 m <sup>2</sup> 以上～1.5 m <sup>2</sup> 未満 | 25 mg 4T 2× |
|                           | 1.5 m <sup>2</sup> 以上                        | 20 mg 6T 2× |

## 注意事項

S-1 はベバシズマブ投与日の夕から開始です。

| 投与方法：1 日目 |                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 生食 100mL (ケモセーフロックの点滴セット不要)<br>メインルートをプライミング                                                                                           |
| 2         | <u>ベバシズマブ</u> _____ mg, 生食 100mL<br>メインルートから、<br>90 分、(問題なければ) 次は 60 分、(問題なければ) 以降 30 分<br>注意：点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与 (初回扱い) |
| 3         | 生食 100mL<br>メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄                                                                                        |