

レジメン名称: SOX (オキサリプラチン+S-1)

大腸癌

ID患者氏名様（性別）

身長cm体重kg年齢歳体表面積m²

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22
オキサリプラチン	130 mg/m ²	↓
S-1(内服)	80 mg/m ² /day	↓.....↓ オキサリプラチン投与日の夕から 15 日目の朝まで 2 週間内服、1 週間休み

レジメンオーダ以外に必要な処方

Day1～:S-1 2×朝夕食後、day1 夕～ 14 日分

必要時（制吐剤予防投与）：day2～：デキサメタゾン（デカドロン）4～8mg 1×朝 2 日間 内服

S-1 投与量	体表面積（m ² ）	投与量
80 mg/m ² /day	1.25 m ² 未満	20 mg 4T 2×
	1.25 m ² 以上～1.5 m ² 未満	25 mg 4T 2×
	1.5 m ² 以上	20 mg 6T 2×

注意事項

S-1 はオキサリプラチン投与日の夕から開始です。

投与方法：1 日目	
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たす
2	グラニセトロン 3mg/100mL 1V、デキサート(3.3mg/1.0mL) 2A 30 分かけて点滴 メインルートから投与 終了後、メインルートを止める
3	<u>オキサリプラチン</u> mg, 5%ブドウ糖 500mL 2 時間かけて点滴 ケモセーフロックのルートより投与
4	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄