

レジメン名称(ベクティビックス(Pmab)単独 q2w)

大腸がん

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日 1 コース 2 週間 Day 1.....15(=Day1)
ベクティビックス	6 mg/kg	↓

レジメンオーダー以外に必要な処方

皮膚障害予防：ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% (ヒルドイドソフト) 2本 1日数回

血清 Mg 測定 (3ヶ月に1回以上)

注意事項

ベクティビックスのルートにはフィルター付き輸液セット (ニプロフィルターセット STFPG-20BRCG) 使用

ベクティビックス：インフージョンリアクション (気管支痙攣、蕁麻疹、低血圧、意識消失、ショックなど) に注意。

ベクティビックス初回および8週以上あいた時：投与時に心電図モニター、BP、HR などの確認の必要あり

投与方法：1日目	
1	生食 100mL フィルター付き輸液セット (ニプロフィルターセット STFPG-20BRCG) 使用 メインルートをプライミング
2	ボララミン注 1A、ファモチジン(20mg/20mL) 1A ゆっくり、側管から投与
3	生食 50 mL、デキサート(3.3mg/1.0mL) 2A 15分かけて点滴、メインルートから投与
4	生食 50 mL 100mL/時で、15分間、残破棄可、メインルートから投与
5	ベクティビックス _____ mg, 生食 100mL フィルター付き輸液セット使用 60分かけて点滴、メインルートから投与 初回および8週以上あいた時、下記を実施 心電図モニター 投与前、5分後、15分後、30分後、終了時後：BP、HR 測定 投与前、5分後、15分後、30分後、終了時後：全身状態の確認 (呼吸苦、悪寒、発疹、搔痒感、気分不良、嘔気)
6	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄