

レジメン名称(ドセタキセル単独(d1) q3w )

食道がん

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_ )

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日	1 コース 3 週間
		Day 1.....8.....15.....22	
ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	↓	

**注意事項**

ドセタキセルは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

投与方法：1 日目	
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒 (チェンバー) を 3/4 程度満たす
2	グラニセトロン (3mg/100mL) 1V、デキサート(3.3mg/1.0mL) 2A、デキサート(1.65 mg/0.5mL) 1 A 30 分かけて点滴、メインルートから投与 終了後、メインルートを止める
3	<u>ドセタキセル</u> _____ mg, 生食 250mL 1 時間かけて点滴 ケモセーフロックのルートより投与
4	ソルデム 3A 200mL 約 30 分かけて点滴、メインルートから投与