

レジメン名称：アドセトリス q3w CD30 陽性のホジキンリンパ腫、末梢性T細胞リンパ腫

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

HBs 抗原 (+ -) HBc 抗原 (+ -) HCV 抗体 (+ -) _____

薬剤	投与量	投与日 1 コース 3 週間 Day 1・・・・8・・・・15・・・・22
アドセトリス	1.8 mg/kg (最高 180mg/回)	↓

レジメンオーダー以外に必要な処方：なし

注意事項

アドセトリス：インフュージョンリアクション（気管支痙攣，蕁麻疹，低血圧，意識消失，ショックなど）に注意。

投与方法：1 日目	
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たし、メインルートを止める
2	アドセトリス mg (最高 180mg)、(1 バイアル注射用水 10.5mL で溶解、5 mg/mL)、 ケモセーフロックのルートより投与 50mg 以下：生食 50mL で希釈、30 分で 50～150mg：生食 100mL で希釈、30 分で 150mg 以上：生食 250mL で希釈使用、60 分で (最終濃度は 0.4～1.2mg/mL とすること) 初回および 8 週以上あいたとき：開始 5 分後、15 分後、終了時に体温、脈拍、血圧測定 2 回目以降：終了時に体温、脈拍、血圧測定
3	1 の生食を使用し、メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄

出水総合医療センター レジメン管理委員会