

レジメン名称:CHOP

悪性リンパ腫

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日 1 コース 3 週間													
		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
プレドニン	100 mg/body		↓	↓	↓	↓	↓								
ドキソルビシン	50 mg/m ²		↓												
オンコビン	1.4 mg/m ² (最大 2mg)		↓												
エンドキサン	750 mg/m ²		↓												

レジメンオーダー以外に必要な処方

プレドニン(5) 20T 2×朝昼食後 4 日分、化学療法翌日から

注意事項

ドキソルビシン、オンコビンは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

ドキソルビシン：総投与量 500 mg/m² 以下

投与方法：1 日目	
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たす
2	グラニセトロン（3mg/100mL）1V 30 分かけて点滴、メインルートから投与 終了後、メインルートを止める
3	プレドニン 100mg、生食 10 mL、下の側管からゆっくり静注
4	<u>ドキソルビシン</u> _____ mg、生食 100 mL、30 分かけて点滴、ケモセーフロックのルートより投与
5	<u>オンコビン</u> _____ mg、生食 50 mL、10 分かけて点滴、ケモセーフロックのルートより投与
6	<u>エンドキサン</u> _____ mg、生食 100mL、60 分かけて点滴、ケモセーフロックのルートより投与
7	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄