

レジメン名称: THP-COP 療法

悪性リンパ腫

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日														
		1 コース 3 週間 Day 1 2 3 4 5 8 15 22														
プレドニン	100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓	(day2 からは内服、計 5 日間投与)									
ピノルビン	50 mg/m ²	↓														
オンコビン	1.4 mg/m ² (最高 2mg)	↓														
エンドキサン	750 mg/m ²	↓														

レジメンオーダ以外に必要な処方

プレドニン(5) 20T 1×朝食後 4日分、化学療法翌日から

注意事項

ピノルビン、オンコビンは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

ピノルビン：総投与量 950 mg/m² 以下

投与方法：1 日目	
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミングし、ルートキープ 点滴筒 (チェンバー) を 3/4 程度満たす
2	グラニセトロン (3mg/100mL) 1V 30 分かけて点滴、メインルートから投与 終了後、メインルートを止める
3	プレドニン 100mg、生食 10 mL、下の側管からゆっくり静注
4	<u>オンコビン</u> _____ mg、生食 50 mL、10 分かけて点滴、ケモセーフロックのルートより投与
5	<u>ピノルビン</u> _____ mg、生食 100mL、30 分かけて点滴、ケモセーフロックのルートより投与
6	<u>エンドキサン</u> _____ mg、生食 100mL、60 分かけて点滴、ケモセーフロックのルートより投与
7	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄