

レジメン名称(Weekly ボルテゾミブ 4 投 1 休 q5w)

多発性骨髄腫

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

HBs 抗原 (+ -) HBc 抗原 (+ -) HCV 抗体 (+ -)

薬剤	投与量	1 コース 5 週間			
		Day 1	8	15	22
ボルテゾミブ(皮下注)	1.3 mg/m ²	↓	↓	↓	↓
レナデックス(内服)	40 mg/body	↓	↓	↓	↓

レジメンオーダー以外に必要な処方

レナデックス(4) 10 錠 1×朝食後 day1、8、15、22

必要時アシクロビル、フェブリク (下記)

注意事項

調製後、8 時間以内に使用すること。

皮下投与の部位：左右の腹部等に交互に注射するなど、前回と同じ部位への投与は避けること（皮下脂肪組織の萎縮や硬結をきたして、薬液の吸収が悪くなることもある。また皮膚の炎症などを起こす可能性が高くなる）

帯状疱疹：アシクロビル予防投与をすることがある（例：200・400mg/日）。

腫瘍崩壊症候群：フェブリクなどを予防投与することがある。



投与方法：1、8、15、22 日目	
1	ボルテゾミブ _____ mg, 皮下注 皮下注の場合：1V（3mg）あたり生食 1.2mL で溶解し、適量を使用