レジメン名称 リツキシマブ単独 q3w 【速度変更版 1】 CD20 陽性悪性リンパ腫など

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

HBs 抗原 (+ -) HBc 抗原 (+ -) HCV 抗体 (+ -)

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22
リツキシマブ	375 mg/m ²	↓

レジメンオーダー以外に必要な処方

ロキソプロフェン(60) 1錠 1× 1日分 リツキシマブ投与前

フェキソフェナジン(60) 1錠 1× 1日分 リツキシマブ投与前

注意事項

リツキシマブ：インフュージョンリアクション（気管支痙攣，蕁麻疹，低血圧，意識消失，ショックなど）に注意。

前処置薬は必須（抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤）

点滴速度に注意してください

投与方法：1日目	
1	ロキソプロフェン(60) 1錠 内服 リツキシマブの 30分前に
2	フェキソフェナジン(60) 1錠 内服 リツキシマブの 30分前に
3	(ケモセーフ不要) 生食 100mL、メインルートをプライミング
4	リツキシマブ _____ mg、生食、適量（10倍希釈以上、総量 600mL を超える場合は生食 1000mL を使用） メインルートから投与 初回：50mL/h から開始、患者の状態に変化がなければ、30分毎に 50mL/h ずつ、最大 400mL/h までアップ可能 速度変更時に体温、脈拍、血圧測定 2回目以降：初回に有害事象が grade 2 以下の場合、2回目以降は 100mL/h より開始し、30分毎に 100mL/h ずつ、最大 400mL/h まで速度をあげることができる。 速度変更時に体温、脈拍、血圧測定
5	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄