

レジメン名称(アブラキサン+ゲムシタビン(d1,8,15)_q4w)

膵癌

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日		
		1 コース 4 週間 Day 1.....8.....15.....2229		
アブラキサン	125 mg/m ²	↓	↓	↓
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓	↓	↓

注意事項

アルブミン含有のため、血液製剤同意書を取得して下さい。

フィルター付きラインは使用しないこと

アブラキサンは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

投与方法：1、8、15日目	
1	生食 100mL フィルター付きラインは使用しないこと 。ケモセーフロックの点滴セット（フィルターなし）を使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たす
2	グラニセトロン(3mg/100mL) 1V、デキサート(3.3mg/1.0mL) 2A 30 分かけて点滴、メインルートから
3	生食 100mL ゆっくり、ウォッシュアウト メインルートから（15 分ほど） 終了時、点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たされていること。 終了後、メインルートを止める 最後のウォッシュアウトで使用するので、使い切らないこと
4	アブラキサン _____ mg、生食（100 mL のボトル） 30 分かけて、ケモセーフロックのルートより投与 （液量は投与量により変わるため、ラベルを確認）
5	生食 100mL ケモセーフロックバッグスパイクをつける ゆっくり、ウォッシュアウト ケモセーフロックのルートより投与（15 分ほど）
6	ゲムシタビン _____ mg、生食 100 mL 30 分かけて、ケモセーフロックのルートより投与
7	3 の生食を使用し、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄

出水総合医療センター レジメン管理委員会