

レジメン名称 GC:シスプラチン(d1,8)+ゲムシタビン(d1,8) q3w 胆道癌

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日 1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22	
シスプラチン	25 mg/m ²	↓	↓
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓	↓

レジメンオーダー以外に必要な処方

必要時 (制吐剤予防投与) : 点滴翌日 ~ : デキサメタゾン (デカドロン) 4~8mg 1×朝 2日間 内服

注意事項

グラニセトロンは生食 500mL 開始 30 分後に開始です

投与方法 : 1 日目、8 日目		
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒 (チェンバー) を 3/4 程度満たす	
2	フィジオ 140 500mL、硫酸 Mg 補正液 7 mL 60 分かけて点滴、メインルートから投与	
3	生食 500mL 60 分かけて点滴、メインルートから投与 次のグラニセトロンはこの生食開始 30 分後に開始	
4		グラニセトロン(3mg/100mL) 1V、デキサート(3.3mg/1.0mL) 3A 30 分かけて点滴、 下の側管から 3 の生食開始 30 分後に開始 (生食とグラニセトロンは同時投与)
5		※メインルートを止めてから マンニトール S 300mL 1V 30 分かけて点滴 30 分かけて点滴、下の側管から投与
6	シスプラチン _____ mg、生食、全量 500 mL 60 分かけて、ケモセーフロックのルートより投与	
7	生食 100mL、メインルートから投与 ウォッシュアウト、ゆっくり、15 分ほど、その後止める。 最後まで使用するので使い切らないこと	
8	※メインルートを止めてから ヴィーン F 500mL 60 分かけて点滴、下の側管から投与	
9	ゲムシタビン _____ mg、生食 100 mL 30 分かけて、ケモセーフロックのルートより投与	
10	7 の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄	