

レジメン名称 **イミフィンジ維持療法 q4w**

胆道癌

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日	1 コース 4 週間
		Day 1.....29	
イミフィンジ	1500mg/body	↓	

レジメンオーダー以外に必要な処方

なし

**注意事項**

前治療として、イミフィンジ+GC 療法を施行していること

体重 30kg 以下の場合、イミフィンジの 1 回投与量は 20mg/kg (体重) とする

**イミフィンジはインラインフィルターを通して投与すること**

イミフィンジ：インフュージョンリアクションに注意 (悪寒、発疹、潮紅、息切れ、浮腫性めまい、発熱等)

**初回および 8 週以上あいた時：心電図モニター、BP、HR などの確認の必要あり (詳細は投与方法の項を参照)**

**特に注意する副作用**

間質性肺疾患、大腸炎・重度の下痢・消化管穿孔、内分泌障害 (甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体機能障害)、1 型糖尿病、肝機能障害・肝炎・硬化性胆管炎、腎障害 (間質性腎炎等)、筋炎・横紋筋融解症、心筋炎、重症筋無力症、髄膜炎、免疫性血小板減少性紫斑病、脳炎、膵炎、重度の皮膚障害、神経障害 (ギラン・バレー症候群を含む)、インフュージョンリアクション (参考：最適使用推進ガイドライン)

投与方法：1 日目	
1	生食 100mL <b>フィルター付き輸液セット使用</b> メインルートにつなぎ、プライミング
2	<b>イミフィンジ 1500 mg</b> 、生食 70 mL、全量 100 mL 60 分かけて点滴、メインルートから投与 <b>初回および 8 週以上あいた時、下記を実施</b> <b>心電図モニター</b> <b>投与前、5 分後、15 分後、終了時後：BP、HR 測定</b> <b>投与前、5 分後、15 分後、終了時後：全身状態の確認 (悪寒、発疹、潮紅、息切れ、浮腫性めまい、発熱等)</b>
3	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄