

レジメン名称(ゲムシタビン(day 1, 8)+ S-1(60mg/m²) q3w) 胆道癌

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22
ゲムシタビン	1000mg/m ²	↓ ↓
S-1(内服)	60 mg/m ² /day	↓ ↓ ゲムシタビン投与日の夕から 15 日目の朝まで 2 週間内服、1 週間休み

レジメンオーダー以外に必要な処方

Day1～:S-1 2×朝夕食後、day1 タ～ 14 日分

必要時（制吐剤予防投与）：day2～：デキサメタゾン（デカドロン）4～8mg 1×朝 2 日間 内服

S-1 投与量	体表面積（m ² ）	投与量
60 mg/m ² /day	1.25 m ² 未満	朝 40 mg、夕 20mg （60 mg/日）
	1.25 m ² 以上～1.5 m ² 未満	20 mg 4T 2× （80 mg/日）
	1.5 m ² 以上	25 mg 4T 2× （100 mg/日）

注意事項

S-1：服用開始の用法に注意してください（ゲムシタビン投与日の夕から開始）。

投与方法：1 日目、8 日目	
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たす
2	グラニセトロン(3mg/100mL) 1V 30 分かけて点滴、メインルートから投与 終了後、メインルートを止める
3	<u>ゲムシタビン</u> _____ mg、生食 100 mL 30 分かけて、ケモセーフロックのルートより投与
4	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄

(参考：GEST study, JCOG 1113)

出水総合医療センター レジメン管理委員会