

レジメン名称(CAF 療法)

乳がん

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日
		Day 1.....8.....15.....22
ドキソルビシン	50 mg/m ²	↓
エンドキサン	500 mg/m ²	↓
フルオロウラシル	500 mg/m ²	↓

レジメンオーダー以外に必要な処方

必要時 (制吐剤予防投与) : day2～: デキサメタゾン (デカドロン) 4～8mg 1×朝 2日間 内服

注意事項

ドキソルビシン: 心毒性に注意、投与前に心機能を評価すること、総投与量 500 mg/m²を超えないこと、血管痛に注意
ドキソルビシンは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください

投与方法: 1日目	
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒 (チェンバー) を 3/4 程度満たす
2	グラニセトロン(3mg/100mL) 1V、デキサート(3.3mg/1.0mL) 5A 30 分かけて点滴、メインルートから投与 終了後、メインルートを止める
3	<u>ドキソルビシン</u> _____ mg、生食 100 mL 30 分かけて点滴、ケモセーフロックのルートより投与
4	<u>エンドキサン</u> _____ mg、生食 250 mL 60 分かけて点滴、ケモセーフロックのルートより投与
5	<u>フルオロウラシル</u> _____ mg、生食 40 mL 全開で点滴、ケモセーフロックのルートより投与
6	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄