

レジメン名称 (TC 療法 (ドセタキセル + エンドキサン))

乳がん

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日	
		1 コース 3 週間	
		Day 1.....8.....15.....22	
ドセタキセル	75 mg/m ²	↓	
エンドキサン	600 mg/m ²	↓	

レジメンオーダー以外に必要な処方

Day 2,3: デカドロン (0.5) 16T、ナゼア OD (0.1) 1T 1×朝食後、2日間

乳腺外科指示あるとき (必要時): ジーラスタ皮下注 1本 抗がん剤終了 24~72 時間後

注意事項

乳腺外科時: ドセタキセル投与時は手足冷却 (主に手足の指) を行うこと

ドセタキセルは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

投与方法: 1 日目	
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒 (チェンバー) を 3/4 程度満たす
2	グラニセトロン (3mg/100mL) 1本、ファモチジン 20mg 1V デキサート (3.3mg/1.0mL) 2A、生食 ポララミン 5mg/1mL 1A 30 分かけて点滴、メインルートから投与 終了後、メインルートを止める
3	<u>ドセタキセル</u> _____ mg、5%ブドウ糖 250 mL 60 分かけて点滴、ケモセーフロックのルートより投与 <u>乳腺外科時: ドセタキセル投与時は手足冷却 (主に手足の指) を行うこと</u>
4	<u>エンドキサン</u> _____ mg、生食 100 mL 30 分かけて点滴、ケモセーフロックのルートより投与
5	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄

出水総合医療センター レジメン管理委員会