

レジメン名称: カドサイラ

乳がん

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22
カドサイラ	3.6 mg/kg	↓

注意事項

カドサイラ：インフージョンリアクション（気管支痙攣，蕁麻疹，低血圧，意識消失，ショックなど）に注意。

専用フィルター付き輸液セット使用

心機能に注意、カドサイラ投与前には心機能を評価する（EF 50%以上）

投与方法：1 日目	
1	生食 100mL ケモセーフロック (フィルター付き) の点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たす
2	デキサート(3.3mg/1.0mL) 2A、生食 50 mL 30 分かけて点滴、メインルートから投与 終了後、メインルートを止める
3	カドサイラ _____ mg, 生食 250mL カドサイラは注射用水で溶解：100mg/5mL、160mg/8mL 90 分かけて、（問題なければ）以降 30 分かけて、ケモセーフロックのルートより投与 注意：点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与（初回扱い） 初回および 8 週以上あいた時、下記を実施 心電図モニター 投与前、5 分後、15 分後、終了時：BP、HR 測定 投与前、5 分後、15 分後、終了時：全身状態の確認（呼吸苦、悪寒、発疹、掻痒感、気分不良、嘔気）
4	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄