

レジメン名称(ドセタキセル(75mg/m²)+トラスツズマブ、q3w)

乳がん

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)
 身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22
ドセタキセル	75 mg/m ²	↓
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg、2 回目～6 mg/kg	↓

注意事項

心機能に注意 トラスツズマブ投与前には心機能を評価する (EF 50%以上)

ドセタキセルは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

乳腺外科時：ドセタキセル投与時は手足冷却（主に手足の指）を行うこと

投与方法：1 日目	
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たす
2	グラニセトロン (3mg/100mL) 1V、デキサート(3.3mg/1.0mL) 2A、デキサート(1.65mg/0.5mL) 1A 30 分かけて点滴、メインルートから投与 終了後、メインルートを止める
3	<u>ドセタキセル</u> _____ mg, 生食 250mL 1 時間かけて点滴 ケモセーフロックのルートより投与 <u>乳腺外科時：ドセタキセル投与時は手足冷却（主に手足の指）を行うこと</u>
4	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 約 15 分、残は破棄
5	<u>トラスツズマブ</u> _____ mg, 生食 250mL トラスツズマブは注射用水で溶解：60mg/3mL、150mg/7.2mL 90 分、（問題なければ）次は 60 分、（問題なければ）以降 30 分、メインルートから投与 注意：点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与（初回扱い）
6	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄

出水総合医療センター レジメン管理委員会