

レジメン名称(ドセタキセル単独(70mg/m²)_q3w

乳癌

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22
ドセタキセル	70 mg/m ²	↓

レジメンオーダ以外に必要な処方

乳腺外科時：day2～：ベタメタゾン（リンデロン）8mg 1×朝 2日間 内服

注意事項

ドセタキセルは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

乳腺外科時：ドセタキセル投与時は手足冷却（主に手足の指）を行うこと

投与方法：1日目	
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たす
2	デキサート(3.3mg/1.0mL) 2A、生食 100mL 30 分かけて点滴、メインルートから投与 終了後、メインルートを止める
3	<u>ドセタキセル</u> _____ mg, 生食 250mL 1 時間かけて点滴 ケモセーフロックのルートより投与
4	ソルデム 3A 200mL 約 30 分かけて点滴、メインルートから投与