

レジメン名称: トラスツズマブ単独（3週に1回投与）

乳がん

ID _____ 患者氏名 _____ 様（性別 _____）

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 3 週間 Day 1・・・・8・・・・15・・・・22
トラスツズマブ	1 回目 8 mg/kg、2 回目～6mg /kg	↓

注意事項

心機能に注意 トラスツズマブ投与前には心機能を評価する（EF 50%以上）

添付文書より：何らかの理由により予定された投与が遅れた際には、以下のとおり投与することが望ましい。

- 1). 投与予定日より1週間以内の遅れで投与する際は、6 m g / k g を投与する。
- 2). 投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量の8 m g / k g で投与を行う。なお、次回以降は6 m g / k g を3週間間隔で投与する。

投与方法：1日目	
1	(ケモセーフ不要) 生食 100mL メインルートをプライミング
2	トラスツズマブ _____ mg, 生食 250mL トラスツズマブは注射用水で溶解：60mg/3mL、150mg/7.2mL 90 分、（問題なければ）次は 60 分、（問題なければ）以降 30 分、メインルートから投与 注意：点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与（初回扱い）
3	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄

登録年月日 H23/2/4

出水総合医療センター レジメン管理委員会 改訂 H23/11/30