

レジメン名称(ロゼウス(d1,8)+トラスツズマブ(d1) q3w)

乳癌

ID

患者氏名

様

(性別)

身長

cm

体重

kg

年齢

歳

体表面積

m²

薬剤	投与量	投与日		1 コース 3 週間
		Day 1.....8.....15.....22		
ロゼウス	25 mg/m ²	↓	↓	
トラスツズマブ	1 回目 8 mg/kg、2 回目 ~6 mg/kg	↓		

注意事項

心機能に注意 トラスツズマブ投与前には心機能を評価する (EF 50%以上)

ロゼウスはデキサート投与中に開始です。

ロゼウスは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。血管痛に注意。

投与方法：1 日目		
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たし、止める	
2	生食 100 mL、デキサート(3.3mg/1.0mL) 1A 30 分かけて点滴、下の側管から投与 注：次のロゼウスはこのデキサート開始 15 分後に開始	
3		ロゼウス mg、生食 50 mL 全開で点滴、ケモセーフロックのルートより投与 2 のデキサート開始 15 分後に開始 (デキサートとロゼウスは同時投与)
4	ソルデム 3A 200mL 30 分かけて メインルートから投与	
5	トラスツズマブ mg、生食 250mL メインルートから投与 トラスツズマブは注射用水で溶解：60mg/3mL、150mg/7.2mL 90 分、(問題なければ) 次は 60 分、(問題なければ) 以降 30 分 注意：点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与（初回扱い）	
6	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄	

投与方法：8日目		
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たし、止める	
2	生食 100 mL、デキサート(3.3mg/1.0mL) 1A 30 分かけて点滴、下の側管から投与 注：次のロゼウスはこのデキサート開始 15 分後に開始	
3		ロゼウス mg、生食 50 mL 全開で点滴、ケモセーフロックのルートより投与 2 のデキサート開始 15 分後に開始 （デキサートとロゼウスは同時投与）
4	ソルデム 3A 200mL 30 分かけて メインルートから投与	

出水総合医療センター レジメン管理委員会