

レジメン名称(ロゼウス単独(d1,8) q3w)

乳癌

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日		1 コース 3 週間
		Day 1.....8.....15.....22		
ロゼウス	25 mg/m ²	↓	↓	

レジメンオーダー以外に必要な処方

注意事項

ロゼウスはデキサート投与中に開始です。

ロゼウスは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。血管痛に注意。

投与方法：1、8日目		
1	生食 100mL ケモセーフロックの点滴セットを使用 メインルートにつなぎ、プライミング 点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たす	
2	生食 100 mL、デキサート(3.3mg/1.0mL) 1A 30 分かけて点滴、下の側管から投与 注：次のロゼウスはこのデキサート開始 15 分後に開始	
3		ロゼウス _____ mg、生食 50 mL 全開で点滴、ケモセーフロックのルートより投与 2 のデキサート開始 15 分後に開始 (デキサートとロゼウスは同時投与)
4	ソルデム 3A 200mL、約 30 分かけて点滴 メインルートから	

出水総合医療センター レジメン管理委員会