

レジメン名称: キイトルーダ(d1) q3w

MSI-High 固形がん

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日	1 コース 3 週間
		Day 1.....8.....15.....22	
キイトルーダ	200 mg/body	↓	

注意事項

キイトルーダのルートにはフィルター付き輸液セット (ニプロフィルターセット STFPG-20BRCG) 使用

キイトルーダ: インフュージョンリアクション (気管支痙攣, 蕁麻疹, 低血圧, 意識消失, ショックなど) に注意。

初回および 8 週以上あいた時: 心電図モニター、BP、HR などの確認の必要あり (詳細は投与方法の項を参照)

特に注意する副作用

間質性肺疾患、重症筋無力症・心筋炎・筋炎・横紋筋融解症、大腸炎・重度の下痢、1 型糖尿病、免疫性血小板減少性紫斑病
肝機能障害・肝炎、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、副腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、膵炎、下垂体機能障害
インフュージョンリアクション

投与方法: 1 日目	
1	(ケモセーフ不要) 生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	キイトルーダ 200 mg , 生食 50 mL フィルター付き輸液セット使用 30 分かけて点滴、メインルートから投与 初回および 8 週以上あいた時、下記を実施 心電図モニター 投与前、5 分後、15 分後、終了時後: BP、HR 測定 投与前、5 分後、15 分後、終了時後: 全身状態の確認 (呼吸苦、悪寒、発疹、掻痒感、気分不良、嘔気)
3	生食 100mL メインルートから、ゆっくり、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄