

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日	1 コース 1 週
		間	
		Day 1 2 . . . . . 8	
メソトレキセート	100 mg/m <sup>2</sup>	↓	
フルオロウラシル	600 mg/m <sup>2</sup>	↓	
ロイコボリン	10 mg/m <sup>2</sup> /回	× ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	メソトレキセート投与 24 時間後から開始し 6 時間ごとに 6 回投与

レジメンオーダー以外に必要な処方

Day 1 : ダイアモックス 250mg 内服 メソトレキセート投与前・投与 5 時間後の 2 回分

Day 2 ~ : ロイコボリン 10 mg/m<sup>2</sup>/回 メソトレキセート投与 24 時間後から開始し 6 時間ごと、6 回分

**注意事項**

点滴前後に内服があります

投与方法 : 1 日目 ~		
1 日目	1	生食 100mL メインルートをプライミング後、止める
	2	ダイアモックス 250mg 内服
	3	グラニセトロン 3mg/100mL 1V、デキサート (1.65mg) 4A 30 分かけて点滴、下の側管から投与
	4	メソトレキセート _____ mg, 生食 50 mL 15 分かけて点滴 上の側管から投与
	5	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト、ゆっくり滴下、15 分ほど、その後とめる。 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">あとで使用するのですべて使い切らないこと</span>
	6	7% メイロン 20mL 2A、生食 500mL 120 分かけて点滴、下の側管から投与
	7	フルオロウラシル _____ mg, 生食 40 mL 15 分かけて点滴 上の側管から投与
	8	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト、ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄
	9	ダイアモックス 250mg 内服、 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">メソトレキセート点滴終了 5 時間後に内服</span>
2 日目 ~	10 ~	ロイコボリン 10 mg/m <sup>2</sup> /回 内服 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">メソトレキセート投与 24 時間後から開始し 6 時間ごと、計 6 回</span>