

レジメン名称 (XP (カペシタビン+シスプラチン)+トラスツズマブ+アプレピタント q3w) 胃癌

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

| 薬剤 | 投与量 | 投与日 |
|-------------|-------------------------------|---|
| | | 1 コース 3 週間 Day 1 2 3 …… 8 …… 15 …… 22 |
| トラスツズマブ | 1 回目 8 mg/kg、2 回目 ~6mg /kg | ↓ |
| シスプラチン | 80 mg/m ² | ↓ |
| カペシタビン(内服) | 2000 mg/m ² /日 | ↓ …… ↓ シスプラチン投与日の夕から 15 日目の朝まで 2 週間内服、1 週間休み |
| アプレピタント(内服) | | ↓↓↓ 1 日目 : 1 カプセル(125) レジメン通りに、2、3 日目 : 1 カプセル(80) 1 × 朝食後 |

レジメンオーダー以外に必要な処方等

カペシタビンの HFS 予防 : Day1 ~ ピドキサル (20) 3T 3 × (毎日)、

ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% (ヒルドイドソフト) 2 本 1 日数回

Day1 ~ : アプレピタントセット 1 ヒート、1 × 朝食後、1 日目はレジメン通りに、カペシタビン 2 × 朝夕食後、day1 夕 ~ 14

日分

心機能に注意 トラスツズマブ投与前には心機能を評価する (EF 50%以上)

| カペシタビン投与量 | 体表面積 (m ²) | 投与量 (1 錠 300mg) |
|-----------|------------------------|----------------------|
| | 1.36 未満 | 8 T 2 × (2400 mg/日) |
| | 1.36 以上 1.66 未満 | 10 T 2 × (3000 mg/日) |
| | 1.66 以上 1.96 未満 | 12 T 2 × (3600 mg/日) |
| | 1.96 以上 | 14 T 2 × (4200 mg/日) |

注意事項 シスプラチン : 尿測指示が必要ないか、確認してください。アプレピタント : 内服時間に注意してください。

カペシタビン : 服用開始のタイミングに注意してください (シスプラチン投与日の夕から開始)。

| 投与方法 : 0 ~ 2 日目 (前負荷 0 日目、抗がん剤点滴投与日を 1 日目として記載) | | | |
|---|----|-------|--|
| 0 日目 | 1 | 14:00 | ソルデム 1 500mL 3 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 2 | 17:00 | ソルデム 3A 500mL 3 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 3 | 20:00 | ソルデム 1 500mL 4 時間かけて点滴メインルートから投与 |
| 1 日目 | 4 | 00:00 | ソルデム 1 500mL 6 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 5 | 6:00 | ソルデム 3A 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 6 | 10:00 | ※メインルートを止めてから トラスツズマブ _____ mg, 生食 250mL 90 分かけて点滴、下の側管から投与 トラスツズマブは注射用水で溶解 : 60mg/3mL、150mg/7.2mL |
| | 7 | 11:00 | アプレピタント(125) 内服 |
| | 8 | 11:30 | グラニセトロン 3mg/100mL 1V、デキサート (1.65mg) 6A 30 分かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 9 | 12:00 | ※メインルートを止めてから シスプラチン _____ mg, 生食、 全量 500mL 120 分かけて点滴 上の側管から投与 |
| | 10 | 14:00 | ソルデム 1 500mL 3 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 11 | 17:00 | ソルデム 3A 500mL 3 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 12 | 20:00 | ソルデム 1 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| 2 日目 | 13 | 00:00 | ソルデム 1 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 14 | 4:00 | ソルデム 3A 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 15 | 8:00 | ソルデム 1 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与 |