

レジメン名称(アブラキサン単独 q3w)

胃癌

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日
アブラキサン	260 mg/m ²	1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22 ↓

注意事項

アルブミン含有のため、血液製剤同意書を取得して下さい。

フィルター付きラインは使用しないこと

アブラキサンは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

アブラキサン懸濁液はすみやかに使用し、すぐに使用しない場合は冷蔵庫(2~8℃)で遮光保存し、8時間以内に使用すること。

投与方法：1日目	
1	生食 100mL フィルター付きラインは使用しないこと 。 メインルートをプライミングし、止める
2	デキサート(1.65mg/0.5mL) 4A、生食 50mL 15分かけて点滴、下の側管から投与
3	<u>アブラキサン</u> _____ mg、生食 (100 mL のボトル) 30分かけて、上の側管から投与 (液量は投与量により変わるため、ラベルを確認)
4	1の生食を使用し、ウォッシュアウト 15分かけて、適宜途中終了可、残は破棄