

レジメン名称(5-FU(フルオロウラシル) (d1-5)+シスプラチン(d1) 3 週毎、術後補助) 食道癌

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

| 薬剤 | 投与量 | 投与日 | |
|----------|-----------------------|------------------------|--|
| | | 1 コース 3 週間 | |
| | | Day 1 2 3 4 5 …8…15…22 | |
| シスプラチン | 80 mg/m ² | ↓ | |
| フルオロウラシル | 800 mg/m ² | ↓↓↓↓↓ 5 日間持続投与 | |

注意事項

初日のフルオロウラシル投与時は同時に輸液負荷投与があります。

シスプラチン：尿測指示を確認して下さい。

| 投与方法：0～6 日目（前負荷 0 日目、抗がん剤点滴投与日を 1 日目として記載） | | | |
|--|----|-------|--|
| 0 日目 | 1 | 14:00 | ソルデム 1 500mL 3 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 2 | 17:00 | ソルデム 3A 500mL 3 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 3 | 20:00 | ソルデム 1 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| 1 日目 | 4 | 00:00 | ソルデム 1 500mL 6 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 5 | 6:00 | ソルデム 3A 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 6 | 10:00 | ソルデム 1 500mL 90 分かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 7 | 11:30 | グラニセトロン 3mg/100mL 1V、デキサート (1.65mg) 10 A 30 分かけて点滴、メインルートから投与 |
| | 8 | 12:00 | ※メインルートを止めてから シスプラチン _____ mg, 生食、全量 500mL 120 分かけて点滴 上の側管から投与 |
| | 9 | 14:00 | フルオロウラシル _____ mg, 生食 500 mL 24 時間かけて点滴 上の側管から投与 ソルデム 1 と同時に開始 ソルデム 1 500mL フルオロウラシルと同時に開始 3 時間かけて点滴、下の側管から投与 |
| | 10 | 17:00 | ソルデム 1 と同時に開始 ソルデム 3A 500mL フルオロウラシルと同時投与 3 時間かけて点滴、下の側管から投与 |
| | 11 | 20:00 | ソルデム 1 500mL フルオロウラシルと同時投与 4 時間かけて点滴、下の側管から投与 |
| 2 日目 | 12 | 00:00 | ソルデム 1 500mL フルオロウラシルと同時投与 6 時間かけて点滴、下の側管から投与 |
| | 13 | 6:00 | ソルデム 3A 500mL フルオロウラシルと同時投与 4 時間かけて点滴、下の側管から投与 |
| | | 10:00 | |
| | 14 | 14:00 | フルオロウラシル _____ mg, 生食 500 mL 24 時間かけて点滴、上の側管から投与 |
| 3-5 日目 | 15 | 14:00 | フルオロウラシル _____ mg, 生食 500 mL 24 時間かけて点滴、上の側管から投与 |
| 6 日目 | | 終了時 | 生食 20mL ルートウォッシュアウト、ゆっくり 下の側管から |