

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日	
		1 コース 3 週間	
		Day 1.....8.....15.....22	
ドセタキセル	60 mg/m ²	↓	
シスプラチン	6 mg/m ²	↓↓↓↓↓	Day1~5 投与
フルオロウラシル	350 mg/m ²	↓↓↓↓↓	Day1~5 持続投与

注意事項

ドセタキセルは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

投与方法：1 日目	
1	生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	グラニセトロン(3mg/100mL) 1V、デキサート(1.65 mg/0.5mL) 5A 30 分かけて点滴、下の側管から投与
3	<u>ドセタキセル</u> _____ mg、生食 250 mL 1 時間かけて、上の側管から投与
4	<u>シスプラチン</u> _____ mg、生食 100mL 15 分で点滴、上の側管から投与 (必ず単独で投与)
5	<u>フルオロウラシル</u> _____ mg、生食 500mL 23 時間 45 分で点滴、上の側管から投与 (翌日のシスプラチンまで持続投与)

投与方法：2~5 日目	
1	<u>シスプラチン</u> _____ mg、生食 100mL 15 分で点滴、上の側管から投与 (必ず単独で投与)
2	<u>フルオロウラシル</u> _____ mg、生食 500mL 23 時間 45 分で点滴、上の側管から投与 (翌日のシスプラチンまで持続投与)

(終了時)	生食 20mL ルートウォッシュアウト、ゆっくり。 下の側管から
-------	--