

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日					
		1 コース 8 週間 Day 1・・・8・・・15・・・22・・・29・・・36・・・43・・・50・・・57					
パクリタキセル	100 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓

レジメンオーダー以外に必要な処方

パクリタキセル投与日: レスタミン 5錠 1× 化学療法時 1回分

注意事項

パクリタキセル: アルコール過敏の確認。アルコール含有のため、外来施行時、運転等での来院について確認、注意すること。

パクリタキセルは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

パクリタキセル初回および4週以上あいた時: 心電図モニター、BP、HR測定、全身状態の観察が必要

投与方法: 1、8、15、22、29、36日目	
1	生食 100mL (専用フィルター付き輸液セット使用) メインルートをプライミングし、止める
2	レスタミン(10mg) 5錠 内服
3	デキサート(1.65mg/0.5mL) 5A、ファモチジン(20mg/20mL) 1A、 生食 30 mL 5分以上かけて点滴、下の側管から投与
4	グラニセトロン(3mg/100mL) 1V 30分かけて点滴、下の側管から投与
5	パクリタキセル _____ mg 、生食 250 mL 60分かけて、上の側管から投与 初回および4週以上あいた時、下記を実施 心電図モニター 投与前、5分後、15分後、30分後、終了時後: BP、HR測定 投与前、5分後、15分後、30分後、終了時後: 全身状態の確認 (呼吸苦、悪寒、発疹、掻痒感、気分不良、嘔気)
6	1の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄