

レジメン名称: CHOP 療法

悪性リンパ腫

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

| 薬剤 | 投与量 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1 コース 3 週間 Day 1 2 3 4 5 8 15 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| プレドニン | 100 mg/body | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | (day2 からは内服、計 5 日間投与) | | | | | | | | | |
| ドキシソルビシン | 50 mg/m ² | ↓ | | | | | | | | | | | | | | |
| オンコビン | 1.4 mg/m ² (最高 2mg) | ↓ | | | | | | | | | | | | | | |
| エンドキサン | 750 mg/m ² | ↓ | | | | | | | | | | | | | | |

レジメンオーダー以外に必要な処方

ナゼア 1T 1× 1日分 化学療法時

プレドニン(5) 20T 1×朝食後 4日分、化学療法翌日から

注意事項

ドキシソルビシン、オンコビンは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

ドキシソルビシン：総投与量 500 mg/m² 以下

| 投与方法：1 日目 | |
|-----------|---|
| 1 | ナゼア 1錠 内服 点滴開始 30 分前に |
| 2 | 生食 100mL、メインルートをプライミングし、ルートキープ |
| 3 | プレドニン 100mg、生食 10 mL、下の側管からゆっくり静注 |
| 4 | <u>ドキシソルビシン</u> _____ mg、生食 約 20 mL、下の側管からゆっくり静注 |
| 5 | <u>オンコビン</u> _____ mg、生食 約 20 mL、下の側管からゆっくり静注 |
| 6 | 2 の生食を使用し、ウォッシュアウトし、とめる |
| 7 | <u>エンドキサン</u> _____ mg、生食 100mL、60 分かけて点滴、上の側管から |
| 8 | 2 の生食を使用し、ウォッシュアウト、ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄 |