

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日
		Day 1 2 3 4 5 8 15 22
プレドニン	100 mg/body	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (day2 からは内服、計 5 日間投与)
ピノルビン	50 mg/m ²	↓
オンコビン	1.4 mg/m ² (最高 2mg)	↓
エンドキサン	750 mg/m ²	↓

レジメンオーダー以外に必要な処方

ナゼア 1T 1× 1日分 化学療法時

プレドニン(5) 20T 1×朝食後 4日分、化学療法翌日から

注意事項

ピノルビン、オンコビンは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

ピノルビン：総投与量 950 mg/m² 以下

投与方法：1日目	
1	ナゼア 1錠 内服 点滴開始 30分前に
2	生食 100mL、メインルートをプライミングし、ルートキープ
3	プレドニン 100mg、生食 10 mL、下の側管からゆっくり静注
4	オンコビン _____ mg、生食 約 20 mL、下の側管からゆっくり静注
5	2の生食をとめる
6	ピノルビン _____ mg、生食 100mL、30分かけて点滴、上の側管から
7	エンドキサン _____ mg、生食 100mL、60分かけて点滴、上の側管から
8	2の生食を使用し、ウォッシュアウト、ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄