

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

HBs 抗原 (+ -) HBc 抗原 (+ -) HCV 抗体 (+ -)

薬剤	投与量	投与日					
		1 コース目		2 コース目以降			
		Day 1	2	8	15	22	29
ガザイバ	1000 mg/body	↓	↓	↓			↓
トレアキシシ	90 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓				↓

(臨床試験では 6 サイクル、その後維持療法 (ガザイバ 2 ヶ月に 1 回、最長 2 年間))

レジメンオーダー以外に必要な処方

- ロキソプロフェン(60) 1 錠 1× 1 日分 ガザイバ投与前
- デキサメタゾン 8mg 2 日分 day3~4 (制吐目的)
- ニューモシスチス肺炎予防に ST 合剤 (ダイフェン) 投与を検討
- 腫瘍崩壊症候群のリスクが高い場合、フェブリク投与を検討

**注意事項**

ガザイバ: インフュージョンリアクション (気管支痙攣, 蕁麻疹, 低血圧, 意識消失, ショックなど) に注意。

ガザイバのルートにはフィルター付き輸液セット (ニプロフィルターセット STFPGP-20BRCG) 使用

トレアキシシは調製後 3 時間以内に投与終了すること

投与方法: 1 日目	
1	ケモセーフ点滴セット使用 生食 100mL、メインルートをプライミング、ゆっくり (ルートキープ)
2	ロキソプロフェン 1 錠 内服
3	ポララミン注(5mg/1mL) 1A、生食 20mL、静注 下の側管から
4	アロキシ(0.75 mg/5 mL) 1V、デキサート(1.65 mg/0.5mL) 6A、生食 20mL、静注 下の側管から
5	30 分あける
6	メインルートをとめる
7	<p><b>ガザイバ</b> _____ mg、生食 適量、全量 250mL <b>フィルター付きセットを使用</b> 下の側管から投与</p> <p>注意: 投与延期時の点滴時間については、医師確認すること</p> <p>ガザイバ使用初回</p> <p>12mL/時で 30 分点滴 →25 mL/時で 30 分点滴 →37 mL/時で 30 分点滴 →50 mL/時で 30 分点滴 →62 mL/時で 30 分点滴 →75 mL/時で 30 分点滴 →87 mL/時で 30 分点滴 →100 mL/時で点滴</p> <p><b>速度変更直前に体温、脈拍、血圧、SpO<sub>2</sub>測定</b></p> <p>ガザイバ使用 2 回目以降</p> <p>25mL/時で 30 分点滴 →50 mL/時で 30 分点滴 →75 mL/時で 30 分点滴 →100 mL/時で点滴</p> <p><b>速度変更直前に体温、脈拍、血圧、SpO<sub>2</sub>測定</b></p>

8	<b>トレアキシ</b> mg, 注射用水 適量、生食 (250mL 製剤使用) 全量 250mL (トレアキシ 100mg/注射用水 40mL、25mg/注射用水 10mL で溶解) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">調製後 3 時間以内に投与終了すること</div> 1 時間かけて点滴 上の側管から投与 (生食 250mL と同時に開始)	生食 250mL 125mL/時で 下の側管から トレアキシと同時に開始  トレアキシが終わったら、ルートを ウォッシュアウトし、 適宜途中終了 可、残は破棄
---	--	---

投与方法：2 日目		
1	ケモセーフ点滴セット使用 生食 100mL、メインルートをプライミングし、止める	
2	デキサート(1.65 mg/0.5mL) 6A、生食 50mL、15 分で 下の側管から	
3	<b>トレアキシ</b> mg, 注射用水 適量、生食 (250mL 製剤使用) 全量 250mL (トレアキシ 100mg/注射用水 40mL、25mg/注射用水 10mL で溶解) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">調製後 3 時間以内に投与終了すること</div> 1 時間かけて点滴 上の側管から投与 (生食 250mL と同時に開始)	生食 250mL 125mL/時で 下の側管から トレアキシと同時に開始  トレアキシが終わったら、ルートを ウォッシュアウトし、 適宜途中終了 可、残は破棄

2

投与方法：1 コースの 8 日目、15 日目		
1	(ケモセーフ点滴セット不要) 生食 100mL、メインルートをプライミング、ゆっくり (ルートキープ)	
2	ロキソプロフェン 1 錠 内服	
3	ポララミン注(5mg/1mL) 1A、生食 20mL、静注	
4	デキサート(1.65 mg/0.5mL) 4A、生食 20mL、静注	
5	30 分あける	
6	メインルートをとめる	
7	<b>ガザイバ</b> mg、生食、全量 250mL <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">フィルター付きセット</div> を使用 注意：投与延期時の点滴時間については、医師確認すること  ガザイバ使用 2 回目以降 25mL/時で 30 分点滴 →50 mL/時で 30 分点滴 →75 mL/時で 30 分点滴 →100 mL/時で点滴 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">速度変更直前に体温、脈拍、血圧、SpO<sub>2</sub>測定</div>	
8	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄	