

レジメン名称: FOLFIRI

大腸癌

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 cm 体重 kg 年齢 歳 体表面積 m²

薬剤	投与量	投与日	1 コース 2 週間
		Day 1 ······ 15 (=Day1)	
イリノテカン	150 mg/m ²	↓	
レボホリナート	200 mg/m ²	↓	
フルオロウラシル bolus	400 mg/m ²	↓	
フルオロウラシル 持続	2400 mg/m ²	↓	1 日目から 46 時間持続投与

レジメンオーダー以外に必要な処方

必要時 (制吐剤予防投与) : day2~ : デキサメタゾン (デカドロン) 4~8mg 1×朝 2 日間 内服

注意事項

イリノテカンとレボホリナートは同時開始ですが、点滴時間が違いますのでご注意下さい。

投与方法 : 1 日目～

1	生食 100mL メインルートをプライミングし、止める	
2	グラニセトロン 3mg/100mL 1V、デキサート (1.65mg) 4A 30 分かけて点滴、下の側管から投与	
3	レボホリナート mg, 生食 500mL 120 分かけて点滴、 イリノテカンと同時に開始、下の側管から投与	イリノテカン mg, 生食 250mL 90 分かけて点滴、 レボホリナートと同時に開始、上の側管から投与 (イリノテカンは 90 分投与のため、先に終わります)
4	フルオロウラシル mg, 生食 40mL 全開で投与、上の側管から投与	
5	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト、ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄	
6	フルオロウラシル mg, 生食、全量 210mL 5 mL/時、46 時間かけて ケモセーフセットを外して、インフューザーポンプにて投与	