

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日	
		1 コース 2 週間	
		Day 1 2 3 8 15	
イリノテカン	150 mg/m ²	↓	
オキサリプラチン	85 mg/m ²	↓	
レボホリナート	200 mg/m ²	↓	
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	↓ 1日目から 46時間持続投与	
アロキシ 1V、デキサート(1.65)4A		↓	
デカドロン(4)内服(必要時)	1~2錠 1×朝	× ↓ ↓ 2,3日目に内服	
アプレピタント(内服)		↓ ↓ ↓	
1日目: 1カプセル(125)下記の通りに、2,3日目: 1カプセル(80) 1×朝食後			

レジメンオーダー以外に必要な処方

Day1~:アプレピタントセット 1シート、1×朝食後、1日目はレジメン通りに

必要時: Day2, 3: 内服 デカドロン 4~8mg 1×朝食後 2日分

注意事項

オキサリプラチンとレボホリナートは同時投与です。

投与方法: 1日目~			
1	内服 アプレピタント(125) 1C 点滴開始 30分前に内服		
2	アプレピタント内服 30分後より開始 生食 100mL、メインルートをプライミングし、止める		
3	アロキシ 1V、デキサート (1.65 mg/0.5 mL) 4A、生食 100 mL 30分かけて点滴、下の側管から投与		
4	<u>イリノテカン</u> _____ mg, 生食 250mL 90分かけて点滴、上の側管から投与		
5	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <u>レボホリナート</u> _____ mg, 5%ブドウ糖 500mL (必ず 5%ブドウ糖で) 120分かけて点滴、下の側管から投与 オキサリプラチンと同時に開始 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <u>オキサリプラチン</u> _____ mg, 5%ブドウ糖 250mL (必ず 5%ブドウ糖で) 120分かけて点滴、上の側管から投与 レボホリナートと同時に開始 </td> </tr> </table>	<u>レボホリナート</u> _____ mg, 5%ブドウ糖 500mL (必ず 5%ブドウ糖で) 120分かけて点滴、下の側管から投与 オキサリプラチンと同時に開始	<u>オキサリプラチン</u> _____ mg, 5%ブドウ糖 250mL (必ず 5%ブドウ糖で) 120分かけて点滴、上の側管から投与 レボホリナートと同時に開始
<u>レボホリナート</u> _____ mg, 5%ブドウ糖 500mL (必ず 5%ブドウ糖で) 120分かけて点滴、下の側管から投与 オキサリプラチンと同時に開始	<u>オキサリプラチン</u> _____ mg, 5%ブドウ糖 250mL (必ず 5%ブドウ糖で) 120分かけて点滴、上の側管から投与 レボホリナートと同時に開始		
6	1の生食を使用し、ウォッシュアウト、ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄		
7	<u>フルオロウラシル</u> _____ mg, 生食、 全量 210mL 5 mL/時、46時間かけて、ケモセーフセットを外して、インフューザーポンプにて投与		

投与方法: 2, 3日目	
1	内服 アプレピタント(80) 1C 1×朝食後、必要時: デカドロン(4) 1~2錠 1×朝食後