

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日													
		1 コース 2 週間													
		Day 1	2	3	8	15							
イリノテカン	150 mg/m ²	↓													
オキサリプラチン	85 mg/m ²	↓													
レボホリナート	200 mg/m ²	↓													
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	↓ 1 日目から 46 時間持続投与													
アロキシ 1V、デキサート(1.65)8A		↓													
デカドロン(4)内服(必要時)	1~2 錠 1×朝	×	↓	↓	2,3 日目に内服										

レジメンオーダ以外に必要な処方

必要時 : Day2, 3 : 内服 デカドロン 4~8mg 1×朝食後 2 日分

注意事項

オキサリプラチンとレボホリナートは同時投与です。

投与方法 : 1 日目 ~			
1	生食 100mL、メインルートをプライミングし、止める		
2	アロキシ 1V、デキサート (1.65 mg/0.5 mL) 8A、生食 100 mL 30 分かけて点滴、下の側管から投与		
3	イリノテカン _____ mg, 生食 250mL 90 分かけて点滴、上の側管から投与		
4	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> レボホリナート _____ mg, 5%ブドウ糖 500mL (必ず 5%ブドウ糖で) 120 分かけて点滴、下の側管から投与 オキサリプラチンと同時に開始 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> オキサリプラチン _____ mg, 5%ブドウ糖 250mL (必ず 5%ブドウ糖で) 120 分かけて点滴、上の側管から投与 レボホリナートと同時に開始 </td> </tr> </table>	レボホリナート _____ mg, 5%ブドウ糖 500mL (必ず 5%ブドウ糖で) 120 分かけて点滴、下の側管から投与 オキサリプラチンと同時に開始	オキサリプラチン _____ mg, 5%ブドウ糖 250mL (必ず 5%ブドウ糖で) 120 分かけて点滴、上の側管から投与 レボホリナートと同時に開始
レボホリナート _____ mg, 5%ブドウ糖 500mL (必ず 5%ブドウ糖で) 120 分かけて点滴、下の側管から投与 オキサリプラチンと同時に開始	オキサリプラチン _____ mg, 5%ブドウ糖 250mL (必ず 5%ブドウ糖で) 120 分かけて点滴、上の側管から投与 レボホリナートと同時に開始		
5	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト、ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄		
6	フルオロウラシル _____ mg, 生食、 全量 210mL 5 mL/時、46 時間かけて、ケモセーフセットを外して、インフューザーポンプにて投与		

投与方法 : 2, 3 日目	
1	必要時 : デカドロン(4) 1~2 錠 1×朝食後