

# レジメン名称: カペシタビン+アバスチン

# 大腸癌

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日	1 コース 3 週間
		Day 1.....8.....15.....22	
アバスチン	7.5 mg/kg	↓	
カペシタビン(内服)	2000 mg/m <sup>2</sup> /日	↓.....↓	アバスチン投与日の夕から 15 日目の朝まで 2 週間内服、1 週間休み

レジメンオーダー以外に必要な処方

Day1~:カペシタビン 2×朝夕食後、day1 夕~ 14 日分

カペシタビンの HFS 予防: Day1~ピドキサール (20) 3T 3× (毎日)

カペシタビンの HFS 予防: ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% (ヒルドイドソフト) 2本 1日数回

アバスチン: 尿タンパク測定

カペシタビン投与量	体表面積 (m <sup>2</sup> )	投与量 (1錠 300mg)
	1.36 未満	8 T 2× (2400 mg/日)
	1.36 以上 1.66 未満	10 T 2× (3000 mg/日)
	1.66 以上 1.96 未満	12 T 2× (3600 mg/日)
	1.96 以上	14 T 2× (4200 mg/日)

### 注意事項

カペシタビンはアバスチン投与日の夕から開始です。

投与方法: 1 日目	
1	(ケモセーフ不要) 生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	<u>アバスチン</u> _____ mg, 生食 100mL 90 分, (問題なければ) 次は 60 分, (問題なければ) 以降 30 分、側管から投与 注意: 点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与 (初回扱い)
3	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄