

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日
		Day 1.....15(=Day1)
ベクティビックス	6 mg/kg	↓

レジメンオーダー以外に必要な処方

皮膚障害予防：ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% (ヒルドイドソフト) 2本 1日数回

血清 Mg 測定 (3ヶ月に1回以上)

注意事項

ベクティビックスのルートにはフィルター付き輸液セット (ニプロフィルターセット STF6P-20BRCG) 使用

ベクティビックス：インフュージョンリアクション (気管支痙攣、蕁麻疹、低血圧、意識消失、ショックなど) に注意。

ベクティビックス初回および8週以上あいた時：投与時に心電図モニター、BP、HR などの確認の必要あり

投与方法：1日目	
1	(ケモセーフ不要) 生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	ポララミン注 1A、ファモチジン(20mg/20mL) 1A ゆっくり、側管から投与
3	生食 50 mL、デキサート (1.65 mg/0.5 mL) 4A 15分かけて点滴、側管から投与
4	生食 50 mL 100mL/時で、15分間、残破棄可、側管から投与
5	ベクティビックス _____ mg, 生食 100mL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">フィルター付き輸液セット使用</span> 60分かけて点滴、側管から投与 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">初回および8週以上あいた時、下記を実施</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">心電図モニター</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">投与前、5分後、15分後、30分後、終了時後：BP、HR 測定</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">投与前、5分後、15分後、30分後、終了時後：全身状態の確認 (呼吸苦、悪寒、発疹、掻痒感、気分不良、嘔気)</span>
6	1の生食を使用し、ウォッシュアウト、ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄