

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日	
		1 コース 4 週間 Day 1.....8.....15.....22.....29	
アバスチン	5 mg/kg	↓	↓
ロンサーフ(内服)	70 mg/m ² /日	↓..... ↓.....	
アバスチン投与日の夕から 6 日目の朝まで、8 日目の夕から 13 日目朝まで、5 日間内服、2 日間休み、これを 2 回繰り返す、2 週休薬			

レジメンオーダー以外に必要な処方

Day1~:ロンサーフ 2× 朝夕食後、5 日内服 2 日休薬、(1 コース 10 日分)

(ロンサーフ: 催吐リスク中程度のため、必要に応じてドンペリドン等の制吐剤の処方を検討してください)

アバスチン: 尿タンパク測定

ロンサーフ投与量	体表面積 (m ²)	投与量/日 (mg)	処方	
			15mg	20mg
	1.07 未満	70	2T 2×	2T 2×
	1.07 以上 ~ 1.23 未満	80	—	4T 2×
	1.23 以上 ~ 1.38 未満	90	6T 2×	—
	1.38 以上 ~ 1.53 未満	100	4T 2×	2T 2×
	1.53 以上 ~ 1.69 未満	110	2T 2×	4T 2×
	1.69 以上 ~ 1.84 未満	120	—	6T 2×
	1.84 以上 ~ 1.99 未満	130	6T 2×	2T 2×
	1.99 以上 ~ 2.15 未満	140	4T 2×	4T 2×
	2.15 以上	150	2T 2×	6T 2×

注意事項

ロンサーフはアバスチン投与日の夜間分から開始。

投与方法: 1, 15 日目	
1	(ケモセーフ不要) 生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	<u>アバスチン</u> _____ mg, 生食 100mL 90 分, (問題なければ) 次は 60 分, (問題なければ) 以降 30 分、側管から投与 注意: 点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与 (初回扱い)
3	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄