

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22
ドキソルビシン	60 mg/m ²	↓
エンドキサン	600 mg/m ²	↓

レジメンオーダー以外に必要な処方

必要時 (制吐剤予防投与) : day2~ : デキサメタゾン (デカドロン) 4~8mg 1×朝 2日間 内服

注意事項ドキソルビシン : 心毒性に注意、投与前に心機能を評価すること、総投与量 500 mg/m² を超えないこと、血管痛に注意。

ドキソルビシンは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

投与方法 : 1 日目	
1	生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	グラニセトロン(3mg/100mL) 1V、デキサート(1.65mg/0.5mL) 10A 30 分かけて点滴、下の側管から投与
3	<u>ドキソルビシン</u> _____ mg、生食 100 mL 30 分かけて点滴、上の側管から投与
4	<u>エンドキサン</u> _____ mg、生食 250 mL 60 分かけて点滴、上の側管から投与
5	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄