

レジメン名称(EG療法(アロキシ、アプレピタント使用))

乳がん

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日																						
		1 コース 3 週間																						
		Day	1	2	3	⋯	8	⋯	15	⋯	22													
エピルピシン	90 mg/m ²		↓																					
エンドキサン	600 mg/m ²		↓																					
アロキシ 1V、デキサート(1.65)6A			↓																					
デカドロン内服	4mg 1×朝		×	↓	↓																			
アプレピタント(内服)			↓	↓	↓																			
		1日目：1カプセル(125)レジメン通りに、2,3日目：1カプセル(80)1×朝食後																						

レジメンオーダー以外に必要な処方

Day1~3:アプレピタントセット 1 ヒート、1×朝食後、1 日目はレジメン通りに、

Day2,3:デカドロン 4mg 1×朝食後、2日間

注意事項

エピルピシン：心毒性に注意、投与前に心機能を評価すること、総投与量 900 mg/m²を超えないこと、血管痛に注意。

エピルピシンは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

投与方法：1 日目	
1	アプレピタント 125mg 1カプセル内服 30分後に点滴開始
2	生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
3	アロキシ (0.75mg/5mL) 1V、ファモチジン 20mg 1V デキサート (1.65mg/0.5mL) 6A、生食 100mL 30分かけて点滴、下の側管から投与
4	エピルピシン _____ mg、生食 50 mL 15分かけて点滴、上の側管から投与
5	エンドキサン _____ mg、生食 100 mL 30分かけて点滴、上の側管から投与
6	1の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄

投与方法：2、3 日目	
1	アプレピタント 80mg 1カプセル、デカドロン 4mg 1×朝食後