

# レジメン名称 (TC 療法 (ドセタキセル + エンドキサン))

乳がん

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日	
		1 コース 3 週間	
		Day 1.....8.....15.....22	
ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	↓	
エンドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	↓	

レジメンオーダー以外に必要な処方

Day 2, 3: デカドロン (0.5) 16T、ナゼア OD (0.1) 1T 1×朝食後、2日間

## 注意事項

ドセタキセル投与時は手足冷却を行うこと

ドセタキセルは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

投与方法：1日目	
1	生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	グラニセトロン (3mg/100mL) 1本、ファモチジン 20mg 1V デキサート (1.65mg/0.5mL) 4A、生食 ポララミン 5mg/1mL 1A 30分かけて点滴、下の側管から投与
3	<b>ドセタキセル</b> _____ mg、5%ブドウ糖 250 mL 60分かけて点滴、上の側管から投与 <b>(手足冷却)</b>
4	<b>エンドキサン</b> _____ mg、生食 100 mL 30分かけて点滴、上の側管から投与
5	1の生食を使用し、ウォッシュアウト (ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄)

投与方法：2、3日目	
1	デカドロン (0.5) 16T、ナゼア OD (0.1) 1T 1×朝食後 2日間