

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22
カドサイラ	3.6 mg/kg	↓

**注意事項**

カドサイラ：インフージョンリアクション（気管支痙攣，蕁麻疹，低血圧，意識消失，ショックなど）に注意。

専用フィルター付き輸液セット使用

心機能に注意、カドサイラ投与前には心機能を評価する（EF 50%以上）

投与方法：1 日目	
1	（専用フィルター付き輸液セット使用） 生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	デキサート(1.65mg/0.5mL) 4A、生食 50 mL 30 分かけて点滴、下の側管から投与
3	<b>カドサイラ</b> _____ mg, 生食 250mL 90 分かけて、（問題なければ）以降 30 分かけて、上の側管から投与 注意：点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与（初回扱い）  初回および 8 週以上あいた時、下記を実施 心電図モニター 投与前、5 分後、15 分後、終了時：BP、HR 測定 投与前、5 分後、15 分後、終了時：全身状態の確認（呼吸苦、悪寒、発疹、掻痒感、気分不良、嘔気）
4	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄