

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日	
		1 コース 4 週間	
		Day 1.....8.....15.....22.....29	
エンドキサン(内服)	体表面積 1.5 未満 100 mg (2 錠) 1.5 以上 150 mg (3 錠)	↓.....↓ Day1~14 の 2 週間内服、2 週間休み	
メソトレキセート	40mg/m <sup>2</sup>	↓	↓
フルオロウラシル	600mg/m <sup>2</sup>	↓	↓

レジメンオーダー以外に必要な処方

内服エンドキサン(50) 体表面積 1.5 未満 100 mg(2 錠) /日、1.5 以上 150 mg(3 錠)/日、1×朝 day1~14 の 14 日分、  
(Day1 のエンドキサン内服は昼または夕でも可)

必要時 (制吐剤予防投与) : 点滴投与翌日~ : デキサメタゾン (デカドロン) 4~8mg 1×朝 2 日間 内服

**注意事項**

Day1 のエンドキサン内服は昼または夕でも可

投与方法 : 1、8 日目	
1	生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	グラニセトロン(3mg/100mL) 1V 30 分かけて点滴、下の側管から投与
3	<u>メソトレキセート</u> _____ mg、生食 100 mL 30 分かけて点滴、上の側管から投与
4	<u>フルオロウラシル</u> _____ mg、生食 40 mL 全開で点滴、上の側管から投与
5	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄