

# レジメン名称(ドセタキセル+トラスツズマブ療法)

乳がん

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_ )

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日
		Day 1.....8.....15.....22
ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	↓
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg、2 回目～6 mg/kg	↓

## 注意事項

心機能に注意 トラスツズマブ投与前には心機能を評価する (EF 50%以上)

ドセタキセルは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

投与方法：1 日目	
1	生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	グラニセトロン (3mg/100mL) 1V、デキサート(1.65 mg/0.5mL) 5 A 30 分かけて点滴、下の側管から投与
3	<b>ドセタキセル</b> _____ mg, 生食 250mL 1 時間かけて点滴 上の側管から投与
4	1 の生食 100mL を使用して、ゆっくりウォッシュアウト、約 15 分、その後止める。 <b>最後のウォッシュアウトで使用するの、使い切らないこと</b>
5	<b>トラスツズマブ</b> _____ mg, 生食 250mL トラスツズマブは注射用水で溶解：60mg/3mL、150mg/7.2mL 90 分、(問題なければ) 次は 60 分、(問題なければ) 以降 30 分、下の側管から投与 注意：点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与 (初回扱い)
6	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄