

# レジメン名称: トラスツズマブ単独 (3週に1回投与)

乳がん

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22
トラスツズマブ	1 回目 8 mg/kg、2 回目 ~6mg /kg	↓

## 注意事項

心機能に注意 トラスツズマブ投与前には心機能を評価する (EF 50%以上)

添付文書より:何らかの理由により予定された投与が遅れた際には、以下のとおり投与することが望ましい。

- 1). 投与予定日より1週間以内の遅れで投与する際は、6 mg / k gを投与する。
- 2). 投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量の8 mg / k gで投与を行う。なお、次回以降は6 m g / k gを3週間間隔で投与する。

投与方法: 1 日目	
1	(ケモセーフ不要) 生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	<u>トラスツズマブ</u> _____ mg, 生食 250mL トラスツズマブは注射用水で溶解: 60mg/3mL、150mg/7.2mL 90分, (問題なければ) 次は60分, (問題なければ) 以降30分, 側管から投与 注意: 点滴時間は前回投与から8週以上経過している時は90分で投与 (初回扱い)
3	1の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄